

Prueba de aliento con urea para la detección de H. Pylori

LAB11440R

1. **¿Tiene 3 años de edad, o más?** *Si este no es el caso, no se realice esta prueba*
2. **¿ Lleva una hora en ayunas?** *Si este no es el caso, no se realice esta prueba*

Medicamentos aceptables (No deben tomarse el mismo día de la prueba)

Antagonista/
antihistamínicos de los
receptores H2:

- Zantac® (ranitidina)
- Tagamet®
(cimetidina)
- Pepcid® (famotidina)
- Axid® (nizatidina)

Antiácidos:

- Tums®
- Alka Seltzer®
- Mylanta®
- Leche de magnesia
- Maalox®

**Deberá evitarse esta prueba si el paciente ha tomado los
siguientes medicamentos en las últimas dos semanas**

(podrían producir falsos negativos):

- Antibióticos
- Medicamentos que contengan bismuto (Pepto Bismol®)
- Inhibidores de la bomba de protones (IBP):
 - AcipHex® (rabeprazol)
 - Nexium® (esomeprazol)
 - Prevacid® (lansoprazol)
 - Prilosec® (omeprazol)
 - Protonix® (pantoprazol)
 - Zegerid® (omeprazol/ bicarbonato de sodio)
 - Dexilant® (dexlansoprazol)

